Водорастворимые удобрения Aqualis™

в системе фертигации овощных, плодовых и ягодных культур



agro.eurochem.ru

ЕвроХим

Фертигация

это метод внесения удобрений, при котором растворенные в поливной воде препараты поступают к растениям через систему ирригации. В качестве последней может выступать капельная лента, спринклерная система или различные конфигурации гидропонных систем.

Такой подход к питанию растений обладает рядом весомых преимуществ:

- более **эффективное и полное усвоение элементов питания** за счет «адресной» доставки
- возможность **подачи удобрений на любом, даже позднем, этапе** роста культур
- **минимизация потерь** и негативного воздействия на окружающую среду.
- **снижение затрат** за счет меньшего количества удобрений и автоматизации процесса
- **повышение рентабельности** за счет улучшения количественных и качественных показателей урожая.

Однако есть и ряд трудностей, с которыми сталкивается любой фермер при внедрении системы фертигации:

- затраты на покупку дополнительного оборудования
- засорение систем вследствие недопустимого сочетания препаратов или их низкого качества ➔ затраты на промывку или ремонт
- сложность правильного расчета состава и дозировки удобрения.

Для того, чтобы минимизировать риски, необходимо использовать удобрения высокого качества от проверенных производителей и строго соблюдать рекомендации по их применению.

Лучше отдать предпочтение комплексным водорастворимым удобрениям, состав которых уже выверен под каждую фазу развития культур. Для разработки полноценной и сбалансированной системы питания рекомендуется обратиться к специалистам или воспользоваться готовыми и протестированными схемами, представленными в данной брошюре.

Линейка удобрений Aqualis™ от ЕвроХим. Назначение, состав, преимущества

Сбалансированная линейка водорастворимых NPK удобрений Aqualis™ идеально подходит для фертигации овощных, плодовых и ягодных культур, как открытого, так и закрытого грунта. Данные удобрения легко усваиваются и действуют быстрее стандартных.
Это набор марок с различным соотношением питательных макро- и мезоэлементов, дополнительно обогащенных Fe, B, Zn, Cu, Mn, Mo.

Микроэлементы в составе Aqualis™ содержатся в хелатной форме, благодаря чему они хорошо усваиваются растениями. Исключительно высококачественное сырье и передовая технология производства обеспечивают 100% растворимость и биодоступность данных удобрений, в них отсутствует хлор, натрий и балластные вещества.
В состав линейки входят 7 марок, удовлетворяющих потребности культур в любую фазу развития.

Массовые доли питательных веществ в составе водорастворимых NPK удобрений Aqualis™.

		13-40-13 +МЭ	18-18-18 +3MgO +МЭ	20-20-20 +МЭ	12-8-31 +2MgO +МЭ	6-14-35 +2MgO +МЭ	15-15-30 +1,5MgO +МЭ	3-11-38 +4MgO +МЭ
Макроэлементы в общей форме, %:	Общий азот (N)	13	18	20	12	6	15	3
	Нитратный азот (NO_3)	4	5	6	9	4	9	3
	Аммонийный азот (NH_4)	9	4	4	3	2	3	0
	Амидный азот, (NH_2)	0	9	10	0	0	3	0
	Фосфаты (P_2O_5)	40	18	20	8	14	15	11
	Калий (K_2O)	13	18	20	31	35	30	38
	Оксид магния (MgO)	0	3	0	2	2	1,5	4
	Сера (S)	2	3	0	3	9	2	13
Микроэлементы в общей форме, % не менее:	Бор (B)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,025
	Медь* (Cu)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01
	Марганец* (Mn)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Цинк* (Zn)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,025
	Железо** (Fe)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Молибден (Mo)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
	Вода, % не более	1	1	1	1	1	1	1
	Нерастворимые в воде вещества, % не более	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

* хелат EDTA,

** хелат DTPA

Применение Aqualis™ в системах фертигации нормализует pH питательного раствора.

Фермеры часто используют воду с высоким значением pH, добавляя кислоты для нормализации раствора. С Aqualis™ нет необходимости дополнительно подкислять раствор.

S
Сера отвечает за биосинтез аминокислот и более полное усвоение азота, а также формирует устойчивость растений к перепадам температур

Mg
Магний стимулирует транспорт веществ, катализирует синтез АТФ; вместе с железом участвует в образовании хлорофилла

B
Бор улучшает процессы опыления и оплодотворения, активизирует выработку ферментов

Cu
Медь регулирует фотосинтез и водный обмен в растениях

Mn
Марганец отвечает за дыхание, усвоение азота и синтез витамина С

Zn
Цинк входит в структуру биомембран и состав многих растительных ферментов, активизирует синтез витаминов и гормона роста – ауксина

Fe
Железо регулирует процессы окисления и восстановления сложных органических соединений, играет важную роль в дыхании растений

Mo
Молибден — незаменимый элемент полноценной фиксации азота, восстановления нитратов и синтеза белков

Водорастворимые NPK Aqualis™ обеспечивают:

- повышение урожайности, количества и качества требуемых показателей: сухого вещества (сахаров и витаминов);
- снижение стрессового воздействия пестицидов на культуру без влияния на эффективность подавления сорняков;
- повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды и заболеваниям;
- сбалансированное питание в критический период развития, биостимулирующее действие на культуру;
- получение ранней и высококачественной продукции благодаря сбалансированному соотношению питательных веществ и отсутствию хлоридов;
- быстрый и равномерный рост растений за счет высокой эффективности усвоения всех питательных веществ и их оптимальной концентрации.

Преимущества линейки:

- комплексное NPK-питание в одном растворе
- микроэлементы в хелатной форме наиболее доступны, не выпадают в осадок;
- выверенный состав для любой фазы развития;
- для производства используется только высококачественное сырьё;
- полное отсутствие хлоридов
- исключена ошибка в превышении дозировок микроэлементов;
- европейское качество продукта.



Широкий ассортимент марок



Стартовая марка

Марка с повышенным содержанием фосфора 13-40-13 применяется в начале вегетации для стимулирования развития корневой системы, способствует лучшему укоренению рассады. Азот, калий и микроэлементы в составе помогают заложить здоровые и сильные генеративные органы для качественного урожая.
Азот преобладает в аммонийной форме, стимулирует развитие корневой системы.

- **улучшает приживаемость рассады**
- **улучшает процессы обмена веществ**
- **стимулирует формирование репродуктивных органов**



Универсальная марка

Равновесные марки 18-18-18 и 20-20-20 разработаны для обеспечения культур необходимыми элементами питания в процессе вегетации, поддержания активного роста и планомерного развития культур.
Марка 18-18-18 дополнительно содержит магний, благодаря чему увеличивает активность фотосинтеза и стимулирует образование питательных веществ в растении.

- **эффективны при стрессовых условиях**
- **подходят для подкормок растений на всех фазах развития**
- **хорошие результаты при фертигации на бедных почвах**



Финальная марка

Марки с повышенным содержанием калия 6-14-35, 12-8-31, 15-15-30 применяются в период роста и созревания плодов, стимулируют отток питательных элементов от вегетативных органов растения к генеративным, способствуют равномерному созреванию плодов и повышению их качества.

- **повышают устойчивость к стрессовым факторам**
- **способствуют дружному созреванию продукции**
- **улучшают вкусовые качества, товарный вид и сроки хранения продукции**
- **повышают сахаристость корнеплодов**



Специальная марка

Специальная марка 3-11-38 — хорошо подходит для обеспечения минерального питания овощных культур, требующих дополнительных подкормок калий-содержащими удобрениями.
Применяется для выращивания декоративно-цветочных и плодово-ягодных культур. Подходит для некорневых подкормок во второй половине вегетации картофеля, капусты и корнеплодов обеспечивает лучшее качество урожая и повышает лежкость продукции.

- **сохраняет все преимущества калийных марок Aqualis™**
- **подходит для поздних фаз вегетации при отсутствии необходимости применять азот**
- **содержит 13% серы**



Отсутствие хлоридов и сбалансированное соотношение питательных элементов способствует повышению качества готовой продукции


Важно для хлорофобных культур, например томата, где наличие хлора влияет на вкусовые качества.



Подтвержденный результат
для любых культур

Результаты полевых опытов в Краснодарском крае

В АФ «Мысхако» на **винограде** тестировалась схема питания с удобрениями Aqualis™ в сравнении со стандартной системой питания, применяемой в хозяйстве. Прибавка урожая ягод на сорте Пино Нуар составила 12 ц/га,




дополнительная прибыль 52 тыс. руб/га. Отмечалось улучшение состояния листового аппарата, увеличение массы гроздей.



Контроль ЕвроХим


Результаты показали, что систематическое применение водорастворимых Aqualis™ для фертигации увеличивает урожайность **земляники садовой** на 68 кг со 100 м^2 или на 23%.



Кроме того, удобрения обеспечили увеличение срока хранения ягод, не увеличивая содержание нитратов. Условно чистая прибыль, таким образом, выросла на 12 970 руб/100 м^2.



В АО «Трудовое» на **яблоне** сорта Гренни Смит использование схемы питания ЕвроХим увеличило урожайность яблок на 3,4 тонны с гектара.



Чистая прибыль составила 90 000 руб/га. Дополнительная прибыль на один вложенный рубль, таким образом, составила 2,6 рублей.



Овощные культуры

Схема питания для огурца

Огурец очень требователен к почвенному плодородию, но при этом не переносит высоких концентраций минеральных солей. В связи с этим необходима организация дробного внесения удобрений. Усвоение минеральных элементов в период вегетации идет неравномерно, основная их часть расходуется в период плодоношения (70–80%). Начало образования плодов для огурца является наиболее критичным этапом развития, в этот момент недостаток питания сильно снизит урожайность, а грамотная комплексная подкормка значительно ее повысит.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	Начало вегетации	3-4 листьев	Цветение-начало плодоношения	Плодоношение
Листовое питание	**2 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–4 кг/га** Aqualis™ 12-8-31
Капельное орошение (фертигация)*	**5–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 12-8-31

* дозировки указаны с учетом поливов
1 раз в 2–3 дня




Схема питания для репчатого лука

Луку необходимо комплексное питание с акцентом на фосфор в начале вегетации для развития мощной корневой системы и повышения устойчивости к дефициту влаги. Поступление азота, серы, магния и микроэлементов в фазу активного роста надземной части и начала формирования луковицы стимулирует фотосинтез, повышает количественные и качественные показатели урожая. Высококалийное питание в сочетании с магнием и микроэлементами во время налива луковицы улучшает накопление в ней сухого вещества и сахаров, повышает лежкость при хранении.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	Начало вегетации	Активный рост: формирование луковицы	Налив луковицы
Листовое питание	**2 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–4 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31
Капельное орошение (фертигация)*	**5–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31

* дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня



Схема питания для белокочанной капусты

В начале вегетации для формирования здоровой корневой системы капусте необходим фосфор. Период между образованием розеточных листьев и началом завязывания кочанов является критическим, усиленное комплексное минеральное питание, обогащенное микроэлементами, гарантирует высокий урожай. Во время роста и созревания кочанов необходимы подкормки высококалийными комплексными удобрениями, это улучшит их вкусовые качества и лёжкость при хранении.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	Начало вегетации	Образование кочана	Рост кочана	Созревание
Листовое питание	**2 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	
Капельное орошение (фертигация)*	**5–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 12-8-31	**10–25 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31

* дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня




Схема питания для томата

Корневая система томата отличается слабой усваивающей способностью, поэтому в период бутонизации и начала плодообразования особенно важно хорошее обеспечение фосфором, который усиливает рост корней и влияет на закладку репродуктивных органов. Азот способствует интенсивному нарастанию вегетативной массы. В период массового плодоношения усвоение элементов питания резко возрастает, отзывчивость томата на удобрение повышается. Фосфорно-калийные удобрения на умеренном азотном фоне обеспечат более дружное созревание плодов, повысят их товарное качество и питательную ценность.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	3-5 настоящих листьев / высадка рассады	Бутонизация	Цветение и завязь плодов	Плодоношение
Листовое питание*	**2 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–4 кг/га** Aqualis™ 6-14-35 12-8-31
Капельное орошение (фертигация)**	**10–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**15–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**15–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**15–25 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35

* совместимы с обработками ХСЗР кроме Cu и S содержащих препаратов

** дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня



Схема питания для моркови

Моркови необходимо высокофосфорное питание и цинк в начале вегетации для повышения энергии прорастания и стимуляции обмена веществ.

Комплексное равновесное питание в период активного роста листьев — для полноценного развития листового аппарата и усиления интенсивности фотосинтеза.

Сбалансированное питание с акцентом на калий + магний и микроэлементы в период роста и созревания корнеплода для улучшения товарных и вкусовых качеств, повышения устойчивости к заболеваниям и увеличения длительности хранения.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	2-4 настоящих листа	Образование и рост листьев	Рост корнеплода	2-3 недели до уборки
Листовое питание*	**2 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–3 кг/га** Aqualis™ 6-14-35 12-8-31	**3–5 кг/га** Aqualis™ 3-11-38
Капельное орошение (фертигация)**	**15–25 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–20 кг/га** Aqualis™ 6-14-35 12-8-31	**2–4 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31

* совместимы с обработками ХСЗР кроме Cu и S содержащих препаратов

** дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня



Плодовые и ягодные культуры


Схема питания для винограда

Азот, фосфор и магний в начале вегетации обеспечат равномерное развитие побегов и закладку соцветий винограда. Перед цветением, для стимулирования ростовых процессов и завязывания большего количества ягод в соцветиях, растению необходим фосфор. Для увеличения количества, размера и содержания питательных веществ в ягодах в начале созревания лозы необходима подача высококалийного питания. Калий в конце вегетации также повысит зимостойкость и производительность насаждений на следующий год.



Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	Начало вегетации — рост побегов	Перед цветением	Конец цветения — рост ягод	Начало созревания
Листовое питание	**2 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**2–4 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–4 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35
Капельное орошение (фертигация)*	**5–20 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**10–25 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31


* дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня

Схема питания для садовой земляники

Для энергичного старта роста в начале вегетации землянике нужно фосфорное питание. Фосфор также играет важную роль в формировании ягод земляники и закладке цветочных почек. Поступление достаточных количеств азота и серы важно в период набора зеленой массы. В критический момент бутонизации земляника нуждается в равновесном комплексном питании и поступлении микроэлементов, в особенности бора. В период плодоношения необходимо высококалийное питание, которое положительно влияет на размер, урожайность, окраску, сахаристость и лежкость ягод.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	Бутонизация	Цветение и завязь ягод	Начало созревания ягод	Налив ягод	Ранний послеуборочный период
Листовое питание	**2 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**2–4 кг/га** Aqualis™ 3-11-38	**2 кг/га** Aqualis™ 13-40-13
Капельное орошение (фертигация)*	**10–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**15–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**15–25 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31	**15–25 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31	**10–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13

* дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня






Схема питания для малины

В период отрастания побегов весной малине необходимо комплексное питание. Применение магния эффективно стимулирует фотосинтез. В критический период — перед цветением кустов — требуется поступление фосфора и комплекса микроэлементов, отвечающих за полноценное формирование генеративных органов и повышающих устойчивость к заболеваниям. Поступление калия потребуется в период роста ягод для укрепления тканей растения, повышения урожайности и улучшения вкуса ягод. Фосфор в конце периода вегетации обеспечит зимостойкость и полноценный урожай на будущий год.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	Начало вегетации — рост побегов	Перед цветением	Конец цветения — рост ягод	Начало созревания
Листовое питание	**2 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**2–4 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31	**2 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 Для ремонтантных сортов: 13-40-13
Капельное орошение (фертигация)*	**5–20 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**10–25 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20 Для ремонтантных сортов: 13-40-13

* дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня





Схема питания для плодовых культур (косточковые)

Косточковые культуры требовательны к минеральному питанию. Для стимулирования роста после зимнего периода им необходимо комплексное питание с акцентом на фосфор — основной поставщик энергии для активного роста. В конце цветения и начале завязывания плодов косточковые особенно нуждаются в фосфоре, калии и микроэлементах. При недостатке питания большая часть уже завязавшихся плодов может осыпаться, а избыток азота может стимулировать этот процесс. В послеуборочный период фосфор стимулирует закладку генеративных органов на следующий год.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	До раскрытия плодовой почки	Бутонизация — начало цветения	Конец цветения и завязь плодов	Рост и созревание плодов	Ранний послеуборочный период
Листовое питание*	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–3 кг/га** Aqualis™ 6-14-35 12-8-31	**3–5 кг/га** Aqualis™ 13-40-13
Капельное орошение (фертигация)**	**5–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**10–15 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35	**10–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13

* Совместимы с обработками ХСЗР кроме Cu и S содержащих препаратов

** дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня




Схема питания для яблони

Яблоня — одна из самых эффективных при выращивании на фертигации культур.
В начале сезона, для формирования побегов, развития почек и активного старта необходимо применение фосфорной марки NPK.
В течение сезона рост, закладку бутонов, формирование завязи и начало роста плодов обеспечивают равновесные марки. В период роста, а, затем, созревания плода яблоне необходимы высококалийные марки, которые способствуют накоплению ароматических и питательных веществ в плодах, ускоряют их созревание и повышают лежкость плодов при хранении.

Листовые подкормки:
1–2% раствор по листу
(1–2 кг удобрений на 100 л воды)
каждые 7–10 дней

Капельное орошение:
0,1–0,3% раствор в течение вегетации
(1–3 кг удобрений на 1000 л воды)



	Начало вегетации	«Разрыхление бутона»	Цветение — Завязывание плодов	Рост плода: Лещина — Грецкий орех	Налив плодов
Листовое питание	**2 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**2–4 кг/га** Aqualis™ 6-14-35	**2–4 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**2–4 кг/га** Aqualis™ 6-14-35 12-8-31
Капельное орошение (фертигация)*	**5–20 кг/га** Aqualis™ 13-40-13	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18	**10–25 кг/га** Aqualis™ 18-18-18 20-20-20	**10–25 кг/га** Aqualis™ 6-14-35	**10–25 кг/га** Aqualis™ 3-11-38 6-14-35 12-8-31

* дозировки указаны с учетом поливов 1 раз в 2–3 дня

Узнать больше:

Водорастворимые NPK Aqualis™
7 марок водорастворимых NPK удобрений с микроэлементами и MgO для каждой стадии развития растения

UTEC®
Ингибированный карбамид для снижения непродуктивных потерь азота.

Простые водорастворимые удобрения
Широкая линейка простых водорастворимых удобрений для припосевного внесения, корневых и внекорневых подкормок, фертигации и капельного орошения.

Гранулированные NPK
Комплексные гранулированные NPK удобрения предназначены для сбалансированного питания различных культур.

Стандартные удобрения
Удобрения с доказанной эффективностью применения

Серосодержащие удобрения
Удобрения, дополнительно обогащенные серой, призваны решить проблему серного дефицита в почве и повысить усвоение азота

ЕвроХим — мы эксперты в питании растений!

ЕвроХим — один из лидирующих поставщиков минеральных удобрений в России и СНГ с возможностью производить азотные, фосфорные, калийные, комплексные NPK и водорастворимые удобрения.

Благодаря развитой логистической сети, мы поставляем наши удобрения по всей России и в страны СНГ. Более 30 региональных отделений, офисов и баз хранения ежедневно готовы оказать фермерам всю возможную поддержку по вопросам применения нашей продукции.

Экологичное сырье, выверенный гранулометрический состав и хорошие физико-химические свойства — вот лишь некоторые преимущества удобрений ЕвроХим.

Доверьтесь **лидеру**



agro.eurochem.ru
eurochem_trading
Удобрения ЕвроХим

ЕвроХим